

UCHWAŁA NR 5313 /22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 18 MAJA 2022 ROKU

W SPRAWIE:

udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na zakup aplikatora do brachyterapii wewnątrzodbytniczej.

NA PODSTAWIE:

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2022.547 ze zm.), art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2021.305 ze zm.), art. 114 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022.633 ze zm.)
uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach w wysokości 68 000,00 zł na zakup aplikatora do brachyterapii wewnątrzodbytniczej.

§ 2

1. Dotacja, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok zgodnie z planem: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, §6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zadanie pn. Inwestycje w ochronie zdrowia – symbol zadania 00002.

2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zwróciło się z prośbą o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na zakup aplikatora do brachyterapii wewnątrzodbytniczej.

Powyższą metodę leczenia stosuje się w celu podwyższenia dawki promieniowania na guz odbytnicy, zwiększając szanse na wyleczenie bez zastosowania zabiegu chirurgicznego.

Jakość życia chorych po leczeniu jest nieporównywalnie większa, dzięki uniknięciu stomii.

Zastosowanie brachyterapii wewnątrzodbytniczej zakłada użycie konkretnego specjalistycznego aplikatora, którego Szpital nie posiada.